

BRANDT® Manni-Plex® B-Moly



Διαφυλλικό διάλυμα βορίου-μολυβδαινίου

ΚΛΠ 1(Γ)(ΙΙ)(β): ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

Δηλωμένη περιεκτικότητα

Βόριο (B) ως οξύ, υδατοδιαλυτό. 3,3% β/β
Μολυβδαίνιο (Mo) ως άλας νατρίου, υδατοδιαλυτό. .0,5% β/β

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Ουρία (CAS 57-13-6) (ΚΣΥ1), Βορικό Οξύ (CAS 10043-35-3) (ΚΣΥ1), Αιθανολαμίνη (CAS 141-43-5) (ΚΣΥ1).

Γενικές πληροφορίες

Το BRANDT MANNI-PLEX B-MOLY είναι ένα υγρό λίπασμα που βασίζεται στην τεχνολογία Manni-Plex σχεδιασμένο για να αποτρέπει και να διορθώνει ελλείψεις βορίου και μολυβδαινίου που μπορεί να υπάρχουν σε πολλές και διαφορετικές καλλιέργειες. Σε αντίθεση με τα συμβατικά λιπάσματα, αυτό το προϊόν παρασκευάζεται με ένα μοναδικό μείγμα αλκοολικών σακχάρων (πολύδες) χαμηλού μοριακού βάρους που αντιδρούν με το βόριο και το μολυβδαίνιο που περιέχει αυτό το προϊόν, καθιστώντας το πιο ευκίνητο μέσα στο φυτό, μέσω του ξυλώδους και του φλοιώδους παρεγχύματος, μεταφέροντας βόριο και μολυβδαίνιο απευθείας στις τοποθεσίες ανάπτυξης του φυτού, τόσο αναπαραγωγικές (ιδίως καρπούς και ταξιανθίες) όσο και βλαστικές.

Η τεχνολογία Manni-Plex δρα συνεργιστικά με το βόριο και το μολυβδαίνιο που περιέχονται στο BRANDT MANNI-PLEX B-MOLY, με αποτέλεσμα τη βελτιωμένη αφομοίωση του αζώτου, προς όφελος της ανάπτυξης των ριζών και του αποτελεσματικότερου μεταβολισμού των φυτών.

Το BRANDT MANNI-PLEX B-MOLY έχει σχεδιαστεί για εφαρμογή σε βασικά στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας: Στην αρχή της ριζοβολίας, πριν την άνθηση και κατά την καρπώδηση.

Μερικές από τις κύριες λειτουργίες του βορίου περιλαμβάνουν την παροχή ελαστικότητας στα κύτταρα κατά τη μεγέθυνση των καρπών, καθώς και τη βελτίωση της καρπώδησης και του τελικού μεγέθους των καρπών λόγω της αυξημένου πολλαπλασιασμού των κυττάρων. Το βόριο είναι απαραίτητο για τη μεταφορά του ασβεστίου και προωθεί την υψηλότερη περιεκτικότητα σε σάκχαρα και υδατάνθρακες.

Το μολυβδαίνιο απαιτείται για το σχηματισμό αμινοξέων και πρωτεϊνών από το φυτό, καθώς και για την αζωτοδέσμευση σε καλλιέργειες ψυχανθών όπως το τριφύλλι, η μηδική, η σόγια και η αραχίδα. Το μολυβδαίνιο βοηθά το βόριο να βελτιώσει τη γονιμοποίηση των ανθών και την καρπώδηση και βελτιώνει το ριζικό σύστημα των φυτών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
HM. ΠΑΡ. :



Διανομέας:

K&NE BRANDT™

KNE BRANDT AE

KENTR: ΒΙ.Π.Ε.Θ. Τ.Θ. 48 Σίνδος, 57022, Θεσσαλονίκη
ΥΠΟΚ: 1ο χλμ. Ολ. Σκοπευτηρίου Τ.Θ.13
19003 Μαρκόπουλο, Αναν. Αττικής

Τηλ: 2299063900-63990

Email: info@knebrandt.gr

1GREB2403399

Παρασκευαστής:

BRANDT Europe, S.L.

Ctra. Carmona - Guadajoz, Km 3.1

41410 Carmona (Σεβίλλη) Ισπανία

+34 954 196 230

www.brandt.co

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

Καθαρό Βάρος: 1,2 kg

Φυσική Κατάσταση: Σε Διάλυμα

BRANDT[®] Manni-Plex[®] B-Moly



Οδηγίες χρήσης

Προτεινόμενη δοσολογία

Διαφυλλικό ψεκασμοί

Συνιστώνται τουλάχιστον 2 εφαρμογές. Εφαρμόστε σε τουλάχιστον 10 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα.

Καλλιέργεια	Στάδιο εφαρμογής	Δόση
Χειμερινά σιτηρά: Σιτάρι, κριθάρι	-Από το φύλλο σημεία έως το ξεστάχισμα	200-300 κ.εκ/στρ.
Αραβόσιτος	-Από φύλλο (V3) - Στάδιο ανθίσανσης ηλικιακής ταξινόμησης /στάδιο "μεταξύ" (R1)	150-300 κ.εκ/στρ.
Ψυχανθή	-Κατά την εμφάνιση των πρώτων ανθικών καταβολών -Κατά την καρπόδεση	200-250 κ.εκ/στρ.
Ηλιανθος	-Στο στάδιο των 4 φύλλων -Προανθικά	150-250 κ.εκ/στρ.
Ελαιοκράμβη	-Από τα 4-6 φύλλα έως την έναρξη της βλαστηκής ανάπτυξης -Στο ύψος των 80 εκ.	150-250 κ.εκ/στρ.
Σακαρότευτλα	-Από τα 6-8 φύλλα -2 έως 3 εβδομάδες αργότερα	150-250 κ.εκ/στρ.
Εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, μανταρίνια, λεμονιά κ.ά)	-Προανθικά -Καρπόδεση	200-300 κ.εκ/στρ.
Μηλοειδή (Μηλιά, αχλαδιά)	-Ανάλογα με τις ανάγκες	
Ακτινίδια, Ακρόδρυα		
Ελιά	-Προανθικά -Καρπόδεση -Ανάλογα με τις ανάγκες	200-300 κ.εκ/στρ.
Πυρηνόκαρπα (Ροδάκινο, νεκταρίνι, δαμάσκηνο, βερίκοκο, κεράσι κλπ)	-Προανθικά -Κατά την καρπόδεση -Κατά τη μεγέθυνση του καρπού -Μετά από κλιματική καταπόνηση	200-300 κ.εκ/στρ.
Φράουλα, σμέουρο, μύρτινο, βατόμουρο	-7-10 ημέρες μετά τη μεταφύτευση -Προανθικά -Κατά την καρπόδεση	120-150 κ.εκ/στρ. 200-300 κ.εκ/στρ.
Αμπέλι	-Προανθικά έως τις πλήρεις αναπτυγμένες ταξιανθίες (για την πρόληψη της μικρορραγίας και την ενίσχυση της καρπόδεσης) -Από την καρπόδεση έως το αρχικό φούσκωμα	200-300 κ.εκ/στρ.
Πατάτα	-Εναρξη μεγέθυνσης κονδύλων -50% μεγέθους κονδύλων -80% μεγέθους κονδύλων	150-300 κ.εκ/στρ.
Κηπευτικά (Τομάτα, πεπόνι, μελιτζάνα, κολοκυθάκι, αγγούρι, πεπόνι, καρπούκι, φυλλώδη λαχανικά, λάχανο, φασολάκι κλπ)	-Μετά τη μεταφύτευση και σε αρχικά στάδια	150 κ.εκ/στρ.
Λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο	-Προανθικά -Στην καρπόδεση -Μεγέθυνση καρπών (βρώσιμων τμημάτων) -Μετά από κλιματική καταπόνηση	250 κ.εκ/στρ.
	-Κατά των έναρξη σχηματισμού των ταξιανθιών	200-250 κ.εκ/στρ.

Οδηγίες ανάμιξης και χειρισμού

Γεμίστε το δοχείο ανάμιξης με το ήμισυ της απαιτούμενης ποσότητας νερού και ξεκινήστε ανακίνηση. Προσθέστε προϊόντα με την ακόλουθη σειρά, ανακατεύοντας καλά μετά από κάθε μία προσθήκη: πρόσθετα - βοηθητικά, αγροχημικά και στη συνέχεια λιπάσματα. Γεμίστε τη δεξαμενή με το υπόλοιπο νερό και συνεχίστε την ανάδευση έως ότου το διάλυμα είναι πλήρως αναμεμιγμένο.

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον

P102: Μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P403+P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

EH210: Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Αυτό το προϊόν περιέχει ουρία που μπορεί να απελευθερώσει αμμωνία και να επηρεάσει την ποιότητα του αέρα. Ανάλογα με τις συνθήκες, θα πρέπει να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα.

Συμβατότητα

Το προϊόν είναι συμβατό με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Μην αναμειγνύετε με ορυκτέλαιο, θείο με φυτοφωσφωρικά άλατα ή άλλα προϊόντα με αλκαλικό/υψηλό pH. Για άγνωστους συνδυασμούς, πριν την ανάμιξη στο βυτίο ψεκασμού, ελέγξτε τη συμβατότητα κάνοντας δοκιμή σε δοχείο μικρού όγκου. Δεν περιέχει χλώριο.

Συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης

Φυλάσσεται μεταξύ 5°C και 35°C. Μην στοιβάξετε περισσότερα από 4 μπουκάλια ή παλέτες προϊόντος.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Να χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει αναγνωριζόμενη ανάγκη. Μην υπερβείτε τη δόση εφαρμογής.

Απόρριψη περιέκτη

Ξεπλύνετε τρεις φορές τον άδειο περιέκτη και αποθέστε σωστά το νερό έκπλυσης. Απορρίψτε τα περιεχόμενα και το δοχείο ανάλογα με τοπικούς κανονισμούς και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ: Ο Κατασκευαστής εγγυάται ότι το Προϊόν συμφωνεί με τη χημική περιγραφή που δίδεται στην ετικέτα και είναι κατάλληλη για το σκοπό που δηλώνεται όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Ο Κατασκευαστής και ο Πωλητής δεν παρέχουν καμία άλλη εγγύηση, ρητή ή υπονοούμενη, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης της εμπορευσιμότητας ή της καταλληλότητας για τη συγκεκριμένη χρήση. Ο Αγοραστής και ο Χρήστης αποδέχονται όλους τους κινδύνους που απορρέουν από οποιαδήποτε χρήση αυτού του Προϊόντος. Στην έκταση που προβλέπεται από το νόμο, ο Κατασκευαστής και ο Πωλητής δεν φέρουν ευθύνη στον αγοραστή ή στο χρήστη αυτού του προϊόντος για οποιαδήποτε επακόλουθη, ειδική, τυχαία ή έμμεση ζημία.

Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν αποτελούν ιδιοκτησία ή άδεια της BRANDT Europe, S.L

IGRE82403399