

BRANDT® Manni-Plex® Ca



Διαφυλλικό διάλυμα ασβεστίου

ΚΛΠ 1(Γ)(Ι)(Β): ΥΓΡΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ Ν (Ca) 8 (14)

Δηλωμένη περιεκτικότητα

Ολικό Άζωτο (N). 8,0% β/β
8,0% β/β Νιτρικό Άζωτο (N)
Υδατοδιαλυτό Οξείδιο του ασβεστίου (CaO). 14,0% β/β

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Νιτρικό Οξύ (CAS 15245-12-2) (ΚΣΥ1).

Γενικές πληροφορίες

Η τεχνολογία Manni-Plex κινητοποιεί το ασβέστιο που περιέχεται στο BRANDT MANNI-PLEX Ca, βελτιώνοντας σημαντικά τη μετατόπισή του στα φρούτα και τα εσωτερικά μέρη των καρπών, με αποτέλεσμα την αύξηση της πραγματικής ποσότητας ασβεστίου που εισέρχεται μέσω του φλοιώδους παρεγχύματος στους καρπούς, και ειδικότερα στα κυτταρικά τοιχώματα και στις κυτοπλασματικές μεμβράνες, προάγοντας καλύτερη συσσώρευση ασβεστίου στα κενοτόπια, τα μιτοχόνδρια και τα κυτταρικά τοιχώματα τόσο μέσω των αποπλαστικών όσο και των συμπλαστικών οδών.

Το BRANDT MANNI-PLEX Ca βοηθά το ασβέστιο να παρακάμψει τα υψηλά επίπεδα νατρίου που τείνουν να αναστέλλουν την κίνησή του στις κυτταρικές μεμβράνες. Δεδομένου ότι οι πολυόλες που υπάρχουν στο Manni-Plex έχουν υψηλή Ωμοπροστατευτική λειτουργία, βοηθούν στην αποκατάσταση της οσμωτικής ισορροπίας υπό συνθήκες ξηρασίας και αλατότητας, ενισχύοντας έτσι την σπαργή και την ωσμωτική ισορροπία στα φυτά.

Το BRANDT MANNI-PLEX Ca αυξάνει την αποτελεσματικότητα του ασβεστίου για την πρόληψη και τη διόρθωση συμπτωμάτων τροφопενίας ασβεστίου όπως πικρή κηλίδωση/bitter pit, περιφακιδική κηλίδωση (lenticel spot), υποβαθμίσεις γήρατος (senescence breakdown), σχίσμο (cracking), τάπωμα (blossom rot) και άλλες φυσιολογικές ανωμαλίες. Το BRANDT MANNI-PLEX Ca επίσης βοηθάει στη βελτίωση της συνεκτικότητας των καρπών και στην αύξηση του χρόνου συντήρησής τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
ΗΜ. ΠΑΡ. :



Παρασκευαστής:
BRANDT Europe, S.L.

Ctra. Carmona - Guadajoz, Km 3.1
41410 Carmona (Σεβίλλη) Ισπανία
+34 954 196 230
www.brandt.co

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

Καθαρό Βάρος: 1,42 kg
Φυσική Κατάσταση: Σε Διάλυμα

Διανομέας:

K&NE BRANDT™

KNE BRANDT AE

ΚΕΝΤΡ.: ΒΙ.ΠΕ.Θ. Τ.Θ. 48 Σίνδος, 57022, Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΚ: 1ο χλμ. Ολ. Σκοπευτηρίου Τ.Θ.13

19003 Μαρκόπουλο, Ανατ. Αττική

Τηλ: 2299063900-63990

Email: info@knebrandt.gr

1GREB2403397

BRANDT® Manni-Plex® Ca

BRANDT
Manni-Plex
TECHNOLOGY

Οδηγίες χρήσης

Προτεινόμενη δοσολογία

Διαφυλλικά ψεκασμοί

Συνιστώνται τουλάχιστον 2 εφαρμογές. Εφαρμόστε σε τουλάχιστον 10 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα.

Καλλιέργεια	Στάδιο εφαρμογής	Βοηθά στην	Δόση
Μηλοειδή	•(ΜΗΗΑ) Στην πώση των πετάλων ή την καρποδέση και επανάληψη κάθε 15 ημέρες	Πρόληψη πικρής κηλίδωσης (bitter pit) και υποβλαστικών γύρωσας (essence break-down)	200-400 κ.εκ/στρ.
	•(ΑΧΛΑΔΙΑ) Από την έναρξη μεγέθυνσης του καρπού μέχρι τη συγκομιδή	Πρόληψη γήρανσης, βελτίωση συνεκτικότητας και διάρκειας ζωής στο ράφι	200-400 κ.εκ/στρ.
Πυρηνόκαρπα	•Από την περίοδο σκλήρυνσης του πυρήνα μέχρι την αλλαγή χρώματος	Πρόληψη σχηματισμού βελτίωση συνεκτικότητας και διάρκειας ζωής στο ράφι	200-400 κ.εκ/στρ.
Αμύγδα	•Κατά την καρποδέση (Καρποί σε μέγεθος 3-4 γρ.) «Κατά τη στιγμή που οι καρποί αρχίζουν να ερπίνονται «Κατά την έναρξη της ωρίμανσης	Βελτίωση της συνεκτικότητας της σάρκας, πρόληψη της ήπιας γήρανσης σάρκας του βούτσικου (Bunch stem necrosis)	200-400 κ.εκ/στρ.
Ακτινίδιο	•Στην καρποδέση -2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 15 ημερών κατά την ωρίμανση	Βελτίωση σκληρότητας, και διάρκειας συντήρησης στο ράφι	200-300 κ.εκ/στρ.
Ελά	•Στάδιο αιώρησης του καρπού μέχρι τη συγκομιδή ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας	Λύση ανταχής, πάχους του κυτταρικού τοιχώματος, ποιότητα των καρπών και αντοχής σε καταπονήσεις	200-300 κ.εκ/στρ.
Εσπεριδοειδή	•Στην καρποδέση «Κατά την ωρίμανση «Ανάλογα τις ανάγκες της καλλιέργειας	Βελτίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, αντοχής σε καταπονήσεις και διάρκειας συντήρησης	200-300 κ.εκ/στρ.
Καρποί Μούρα (φράουλα, βατόμουρο λιά)	•Από τον σχηματισμό του πρώτου πράσινου καρπού έως την έναρξη της ωρίμανσης	Βελτίωση συνεκτικότητας και διάρκειας ζωής στο ράφι	200-300 κ.εκ/στρ.
Πατάτα	•Κατά την έναρξη ανάπτυξης των κονδύλων «Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των κονδύλων	Πρόληψη κηλίδωσης και της μούρας κηλίδωσης των κονδύλων	200-300 κ.εκ/στρ.
Κηπευτικά (τομάτα, πιπεριά, αγγούρι κλ)	•Κάντε 2 έως 4 εφαρμογές ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας. ξεκινώντας από την πρώτη μεγέθυνση των καρπών	Πρόληψη του τωπάματος (blossom end rot), των ηλιακών εγκαυμάτων, του σχηματισμού των καρπών και στη συν αναστολή από το stress αλατότητας	200-300 κ.εκ/στρ.
Λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο & Φυλλώδη λαχανικά	•Έναρξη σχηματισμού κεφαλής «Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της κεφαλής	Πρόληψη του παρερρεασικού καψίματος των φυλλών (tip burn)	200-300 κ.εκ/στρ.

Κατά την εφαρμογή σε θερμοκήπια, λόγω υψηλών θερμοκρασιών και καταναγκαστικών συνθηκών, συνιστάται η μείωση των δόσεων εφαρμογής κατά 20% έως 30%.

Οδηγίες ανάμιξης και χειρισμού

Γεμίστε το δοχείο ανάμιξης με το ήμισυ της απαιτούμενης ποσότητας νερού και ξεκινήστε ανακίνηση. Προσθέτετε προϊόντα με την ακολουθία σειρά, ανακατεύοντας καλά μετά από κάθε μία προσθήκη: πρόσθετα - βοληθικά, αγροχημικά και στη συνέχεια λιπάσματα. Γεμίστε τη δεξαμενή με το υπόλοιπο νερό και συνεχίστε την ανάδευση έως ότου το διάλυμα είναι πλήρως αναμεμειγμένο.

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

UFI: 3M91-905M-V008-Q613

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

P102: Μακριά από παιδιά.

P264: Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδυμασία/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΤΗΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν

αγκυλίες επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

P330: Ξεπλύνετε το στόμα.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Συμβατότητα

Το προϊόν είναι συμβατό με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Μην αναμειγνύετε με ορυκτέλαια, θείο, 10-34-0, MAP, DAP, με φωσφορικά άλατα ή άλλα προϊόντα με αλκαλικό/υψηλό pH. Για άγνωση συνδυασμούς, πριν την ανάμιξη στο βυτίο ψεκασμού, ελέγξτε τη συμβατότητα κάνοντας δοκιμή σε δοχείο μικρού όγκου. Δεν περιέχει χλώριο.

Συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης

Φυλάσσεται μεταξύ 5°C και 35°C. Μην στοιβάετε περισσότερα από 4 μπουκάλια ή παλέτες προϊόντος.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Να χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει αναγνωρισμένη ανάγκη. Μην υπερβαίνετε τη δόση εφαρμογής.

Απόρριψη περιέκτη

Ξεπλύνετε τρεις φορές τον άδειο περιέκτη και αποθέστε σωστά το νερό έκπλυσης. Απορρίψτε τα περιεχόμενα και το δοχείο ανάλογα με τοπικούς κανονισμούς και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ: Ο κατασκευαστής εγγυάται ότι το Προϊόν συμφωνεί με τη χημική περιγραφή που δίδεται στην ετικέτα και είναι καταλληλή για το σκοπό που δηλώνεται όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Ο Κατασκευαστής και ο Πωλητής δεν παρέχουν καμία άλλη εγγύηση, ρητή ή υπονοούμενη, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης της εμπορευσιμότητας ή της καταλληλότητας για τη συγκεκριμένη χρήση. Ο Αγοραστής και ο Χρήστης αποδέχονται όλους τους κινδύνους που απορρέουν από οποιαδήποτε χρήση αυτού του Προϊόντος. Στην έκταση που προβλέπεται από το νόμο, ο Κατασκευαστής και ο Πωλητής δεν φέρουν ευθύνη όταν αγοράστεί ή στο χρήστη αυτού του προϊόντος για οποιαδήποτε επακόλουθη, ειδική, τυχαία ή έμμεση ζημία.

Όλα τα εμπορικά ονόματα που αναφέρονται στα παρόν αποτελούν ιδιοκτησία ή άδεια της BRANDT Europe, S.L.

1GREB2403397