

BRANDT® Manni-Plex® B



Διαφυλλικό διάλυμα βορίου

ΚΛΠ 1 (Γ/Ι)(β): ΥΓΡΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ
N 5,5 ΜΕ ΒΟΡΙΟ

Δηλωμένη περιεκτικότητα

Ολικό Άζωτο (N).....5,5% β/β
4,6% β/β Ουρικό Άζωτο (N)
Βόριο (B) ως οξύ, υδατοδιαλυτό.....3,3% β/β

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Ουρία (CAS 57-13-6) (ΚΣΥ1), Βορικό Οξύ (CAS 10043-35-3) (ΚΣΥ1).

Γενικές πληροφορίες

Το BRANDT MANNI-PLEX B είναι ένα υγρό λίπασμα που βασίζεται στην τεχνολογία Manni-Plex σχεδιασμένο για να αποτρέπει και να διορθώνει ελλείψεις βορίου που μπορεί να υπάρχουν σε πολλές και διαφορετικές καλλιέργειες. Σε αντίθεση με τα συμβατικά λιπάσματα, αυτό το προϊόν παρασκευάζεται με ένα μοναδικό μείγμα αλκοολικών σακχάρων (πολυόλες) χαμηλού μοριακού βάρους που αντιδρούν με το βόριο που περιέχει αυτό το προϊόν, καθιστώντας το πιο ευκίνητο μέσα στο φυτό, μέσω του ξυλώδους και του φλοιώδους παρεγχύματος, μεταφέροντας βόριο απευθείας στις τοποθεσίες ανάπτυξης του φυτού, τόσο αναπαραγωγικές (ιδίως καρπούς και ταξιανθίες) όσο και βλαστικές.

Η εφαρμογή του BRANDT MANNI-PLEX B κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου διασφαλίζει επαρκή επίπεδα βορίου. Βοηθά επίσης στην πρόληψη μορφολογικών και φυσιολογικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τροφопενίες βορίου, όπως η σήψη της καρδιάς (Black Heart), η κούφια καρδιά (Hollow heart), το κούφιο στέλεχος (Hollow Stem), το σχίσσιμο του στέλεχους (Crack Stem), η φέλλωση των καρπών (Internal Cork) και η μικροκαρπία (Small Fruit).

Το BRANDT MANNI-PLEX B έχει σχεδιαστεί για εφαρμογή σε βασικά στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας: Στην αρχή της ριζοβολίας, πριν την άνθηση και κατά την καρπώδεση.

Μερικές από τις κύριες λειτουργίες του βορίου περιλαμβάνουν την παροχή ελαστικότητας στα κύτταρα κατά τη μεγέθυνση των καρπών, καθώς και τη βελτίωση της καρπώδεσης και του τελικού μεγέθους των καρπών λόγω του αυξημένου πολλαπλασιασμού των κυττάρων. Το βόριο είναι απαραίτητο για τη μεταφορά του ασβεστίου και προωθεί την υψηλότερη περιεκτικότητα σε σάκχαρα και υδατάνθρακες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΗΜ. ΠΑΡ.:



Παρασκευαστής:

BRANDT Europe, S.L.

Ctra. Carmona - Guadajoz, Km 3.1

41410 Carmona (Σεβίλλη) Ισπανία

+34 954 196 230

www.brandt.co

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

Καθαρό Βάρος: 1,14 kg

Φυσική Κατάσταση: Σε Διάλυμα

Διανομέας:

K&NE BRANDT

KNE BRANDT AE

ΚΕΝΤΡ.: ΒΙ.Π.Ε.Θ. Τ.Θ. 48 Σίνδος, 57022, Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΚ: 1ο χλμ. Ολ. Σκοπευτηρίου Τ.Θ.13

19003 Μαρκόπουλο, Ανατ. Αττικής

Τηλ: 2299063900-63990

Email: info@knebrandt.gr

1GREB2403396

BRANDT® Manni-Plex® B



Οδηγίες χρήσης

Προτεινόμενη βοτανολογία

Διαφυλλικοί ψεκασμοί

Συνιστώνται τουλάχιστον 2 εφαρμογές. Εφαρμόστε σε τουλάχιστον 10 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα.

Καλλιέργεια	Στάδιο εφαρμογής	Δόση
Χειμερινή σιτηρά: Σιτάρι, κριθάρι	Από το φύλλο σημιαία έως το ξεστάχυασμα	100-300 κ.εκ/στρ.
Αραβόσιτος	+3-6 φύλλα (V3) • Στάδιο άνθισης θηλυκής ταξιανθίας /στάδιο "μεταξύ" (R1)	100-300 κ.εκ/στρ.
Ψυχανθή	-Κατά την εμφάνιση των πρώτων ανθικών καταβολών -Κατά την καρπώδωση	100-300 κ.εκ/στρ.
Ηλιανθος	-Στο στάδιο των 4 φύλλων -Προσπονή	100-300 κ.εκ/στρ.
Ελαιοκράμβη	-Από τα 4-6 φύλλα έως την έναρξη της βλαστικής ανάπτυξης -Στο ύψος των 80 εκ.	100-300 κ.εκ/στρ.
Σακχαρότευπτα	-Από τα 6-8 φύλλα -2 έως 3 εβδομάδες αργότερα	100-300 κ.εκ/στρ.
Εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, μανταρίνια, λεμόνια κ.ά)	-Προσπονή	100-300 κ.εκ/στρ.
Μηλοειδή (Μηλιά, αχλαδιά)	-Καρπώδωση	
Ακτινίδιο, Ακρόδρυα	-Ανάλογα με τις ανάγκες	100-300 κ.εκ/στρ.
Ελιά	-Προσπονή -Καρπώδωση -Ανάλογα με τις ανάγκες	
Πυρηνόκαρπα (Ροδάκινο, νεκταρίνι, δαμάσκηνο, βερίκοκο, κεράσι κλπ)	-Προσπονή -Κατά την καρπώδωση -Κατά τη μετεκπονή του καρπού -Μετά από κλιματική καταπόνηση	100-300 κ.εκ/στρ.
Φράουλα, σμέουρο, μύρτινο, βατόμουρο	-7-10 ημέρες μετά τη μεταφύτευση	100-300 κ.εκ/στρ.
	-Προσπονή	100-300 κ.εκ/στρ.
	-Κατά την καρπώδωση	100-300 κ.εκ/στρ.
Αμπέλι	-Προσπονή έως τις πλήρως αναπτυγμένες ταξιανθίες (για την πρόληψη της μικροπυρρίδας και την ενίσχυση της καρπώδωσης) -Από την καρπώδωση έως το αρχικό φρούσκωμα	100-300 κ.εκ/στρ.
Πατάτα	-Εναρξη μεγέθυνσης κονδύλων -50% μεγέθους κονδύλων -80% μεγέθους κονδύλων	100-300 κ.εκ/στρ.
	-Μετά τη μεταφύτευση και σε αρχικά στάδια	100-300 κ.εκ/στρ.
Κηπευτικά (Τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, κολοκυθάκι, αγγούρι, πεπόνι, καρπούζι, φυλλώδη λαχανικά, λάχανο, φασολάκι κλπ)	-Προσπονή -Στην καρπώδωση -Μεγέθυνση καρπών (βρώσιμων τμημάτων) -Μετά από κλιματική καταπόνηση	100-300 κ.εκ/στρ.
Λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο	-Κατά των έναρξη σχηματισμού των ταξιανθιών	100-300 κ.εκ/στρ.

Οδηγίες ανάμιξης και χειρισμού

Γεμίστε το δοχείο ανάμιξης με το ήμισυ της απαιτούμενης ποσότητας νερού και ξεκινήστε ανακίνηση. Προσθέστε προϊόντα με την ακολουθία σειρά, ανακατεύοντας καλά μετά από κάθε μία προσθήκη: πρόσδετα - βοηθητικά, αγροχημικά και στη συνέχεια λιπάσματα. Γεμίστε τη δεξαμενή με το υπόλοιπο νερό και συνεχίστε την ανάδευση έως ότου το διάλυμα είναι πλήρως αναμειγμένο.

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον

ΠΡΟΣΟΧΗ

UF1: AFD0-90DE-D00X-R6VX

H360FD: Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο.

P102: Μακριά από παιδιά.

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

P202: Μην το χρησιμοποιείτε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Αυτό το προϊόν περιέχει ουρία που μπορεί να απελευθερώσει αμμωνία και να επηρεάσει την ποιότητα του αέρα. Ανάλογα με τις συνθήκες, θα πρέπει να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα.

Συμβατότητα

Το προϊόν είναι συμβατό με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Μην αναμειγνύετε με ορυκτέλαιο, θείο με ψευφορικά άλατα ή άλλα προϊόντα με αλκαλικό/υψηλό pH. Για άγνωστους συνδυασμούς, πριν την ανάμιξη στο βύτιο ψεκασμού, ελέγξτε τη συμβατότητα κάνοντας δοκιμή σε δοχείο μικρού όγκου. Δεν περιέχει χλώριο.

Συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης

Φυλάσσεται μεταξύ 5°C και 35°C. Μην στοιβάζετε περισσότερα από 4 μπουκάλια ή παλέτες προϊόντος.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Να χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει αναγνωρισμένη ανάγκη. Μην υπερβαίνετε τη δόση εφαρμογής.

Απόρριψη περιέκτη

Ξεπλύνετε τρεις φορές τον άδειο περιέκτη και αποθέστε σωστά το νερό έκπλυσης. Απορρίψτε τα περιεχόμενα και το δοχείο ανάλογα με τοπικούς κανονισμούς και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ: Ο Κατασκευαστής εγγυάται ότι το Προϊόν συμμορφώνεται με τη χημική περιγραφή που δίδεται στην ετικέτα και είναι κατάλληλη για το σκοπό που δηλώνεται όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Ο Κατασκευαστής και ο Πωλητής δεν παρέχουν καμία άλλη εγγύηση, ρητή ή υπονοούμενη, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης της εμπορευσιμότητας ή της καταλληλότητας για τη συγκεκριμένη χρήση. Ο Αγοραστής και ο Χρήστης αποδέχονται όλους τους κινδύνους που απορρέουν από οποιαδήποτε χρήση αυτού του Προϊόντος. Στην έκταση που προβλέπεται από το νόμο, ο Κατασκευαστής και ο Πωλητής δεν φέρουν ευθύνη στον αγοραστή ή στο χρήστη αυτού του προϊόντος για οποιαδήποτε επακόλουθη, ειδική, τυχαία ή έμμεση ζημία.

Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν αποτελούν ιδιοκτησία ή άδεια της BRANDT Europe, S.L.

IGREB2403396

