

Το **ΒΙΟΦΟΛ SUPER** είναι ένα πολυσύνθετο ειδικό διαφυλλικό λίπασμα σε μορφή υγρού κρυσταλλικού αιωρήματος για τη θεραπεία των τροφωπενιών σε όλες τις καλλιέργειες όπως: Αμπέλια, Εσπεριδοειδή, Πυρηνόκαρπα, Μηλοειδή, Πατάτες, Κηπευτικά, Βαμβάκι, Ελαιοκράμβη, κ.λ.π.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αντιμετώπιση των ανισορροπιών στη θρέψη με ιχνοστοιχεία.
- Άμεση διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων.
- Αποτελεσματικότητα ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες λόγω των επιφανειοδραστικών και προστατευτικών συστατικών που περιέχει.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Πρέπει να αποφεύγονται θερμοκρασίες κάτω από +5 °C και άνω των +40 °C καθώς και συχνές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση. Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν κρυστάλλωση. Αυτοί οι κρύσταλλοι είναι πλήρως υδατοδιαλυτοί και θα διαλυθούν ξανά στο ψεκαστικό διάλυμα. Η παρατεταμένη αποθήκευση μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στο χρώμα. Ούτε η κρυστάλλωση ούτε η αλλαγή χρώματος θα επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο την επιθυμητή φυσιολογική ποιότητα του προϊόντος. Όταν αναμειγνύετε με άλλα προϊόντα για πρώτη φορά, δοκιμάστε σε μικρή κλίμακα πριν από τη γενική χρήση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά

Το λίπασμα αυτό περιέχει ουρία, η οποία μπορεί να εκλύσει αμμωνία και να έχει επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης. Για την αποφυγή κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, τηρήστε τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης αυτού του προϊόντος λίπανσης.

Κίνδυνοι

Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα.

Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.

Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο/τα αυτιά/...

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Περιέχει βορικό οξύ.

UFI: JYP2-50UU-900U-SDJW





ΒΙΟΦΟΛ SUPER



**ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΓΡΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ
ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ Λίπασμα ΝΚ
5-0-10(+3+13) με μικροθρεπτικά στοιχεία.
Σε αιώρημα ΚΛΠ 1 (Γ)(Ι)(Β)(ΙΙ)**

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ	%w/w	g/l
Ολικό Άζωτο	5%	78
Αμμωνιακό Άζωτο	1,4%	22
Καρβαμικό Άζωτο	3,6%	56
Οξείδιο του Καλίου (K ₂ O), υδατοδιαλυτό	10%	157
Οξείδιο του Μαγνησίου (MgO), υδατοδιαλυτό	3,0%	47
Τριοξείδιο του θείου (S ₂ O), υδατοδιαλυτό	13%	204
Βόριο(Β), ως βορικό οξύ υδατοδιαλυτό	0,3%	4,7
Χαλκός (Cu), υδατοδιαλυτός, χηλική μορφή EDTA*	0,5%	7,9
Σίδηρος (Fe), υδατοδιαλυτός, χηλική μορφή EDTA*	1,0%	15,7
Μαγγάνιο (Mn), υδατοδιαλυτό, χηλική μορφή EDTA*	1,5%	23,6
Μολυβδαίνιο (Mo) ως μολυβδαϊνικό νάτριο, υδατοδιαλυτό	0,01%	0,15
Ψευδάργυρος (Zn) υδατοδιαλυτός, χηλική μορφή EDTA*	1,0%	15,7

Χαμηλής περιεκτικότητας σε χλώριο
* εύρος τιμών pH σταθερότητας των χηλικών ενώσεων:
Cu-EDTA: 1,5 - 10 Fe-EDTA: 1,5 - 6,5 Mn-EDTA: 3,0 - 8,0 Zn-EDTA: 2,0 - 9,0
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: EDTA CAS n° 60-00-4 (ΚΣΥ 1): Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών, Υδροξείδιο του καλίου CAS n° 1310-58-3 (ΚΣΥ 1), Θεϊκό μαγνήσιο CAS n° 10034-99-8 (ΚΣΥ 1), Ουρία CAS n° 57-13-6 (ΚΣΥ 1), Θεϊκό κάλιο CAS n° 7778-80-5 (ΚΣΥ 1), Θεϊκό μαγγάνιο CAS n° 10034-96-5 (ΚΣΥ 1)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 λίτρο (1,57 κιλά)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για να πετύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα με το διαφυλλικό λίπασμα, να εφαρμόζεται νωρίς το πρωί, αργά το απόγευμα ή κατά τη διάρκεια συννεφιάς.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Αμπέλι: 100cc/στρ. 2-3 εφαρμογές από την καρπόδεση μέχρι και τον περκασμό.

Εσπεριδοειδή: 300cc/στρ. 1 εφαρμογή πριν την άνθιση και 1 εφαρμογή 2 εβδομάδες μετά την πλήρη άνθιση.

Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα: 100cc/στρ. 1-3 εφαρμογές σε περιόδους ξηρασίας στην αρχή του καλοκαιριού, 4-5 εφαρμογές στη μέση του καλοκαιριού και 2-3 εφαρμογές μετά τη συγκομιδή.

Καλαμπόκι: 100cc/στρ. 1-2 εφαρμογές στα στάδια μεταξύ 2 και 6 φύλλων.

Πατάτα: 100cc/στρ. 1-2 εφαρμογές μετά την περίοδο ανθοφορίας.

Τεύτλα: 200cc/στρ. 2 εφαρμογές από τα 4 φύλλα και μέχρι η καλλιέργεια να καλύψει το έδαφος.

Κηπευτικά (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα κ.α.): 200cc/στρ. 3-4 εφαρμογές κατά το στάδιο της ταχείας ανάπτυξης των φυτών.

Πεπόνι: 200cc/στρ. 3-4 εφαρμογές κατά το στάδιο ανάπτυξης των καρπών.

Βαμβάκι 300cc/στρ. 1 εφαρμογή πριν την άνθιση και 1 εφαρμογή 2 εβδομάδες μετά την άνθιση.

Ελαιοκράμβη: 200cc/στρ. 2 εφαρμογές πριν την άνθιση.

Λοιπές Καλλιέργειες: 200-500cc/στρ. 1-3 εφαρμογές ανάλογα με την καλλιέργεια και την ένταση του προβλήματος.

Ελάχιστο μεσοδιάστημα μεταξύ εφαρμογών σε όλες τις καλλιέργειες 8-10 ημέρες.

Εφαρμόζεται με διαφυλλικό ψεκασμό με όγκο ψεκαστικού υγρού 100-150lt/στρ.

ΑΝΑΚΙΝΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG Heerdt Landstr. 199 · Düsseldorf · Germany

Συσκευασία / Διανομή: K & N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ.48, 570 22, Σίνδος
Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr

